



## ПРИКАЗ ЛОВИШТА У РС



## ЕПИЗООТИОЛОШКА ПОДРУЧЈА НАУЧНИХ И ВЕТЕРИНАРСКИХ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ИНСТИТУТА У РС



## АФРИЧКА КУГА СВИЊА ЈЕ ВИРУСНА, ВЕОМА ОПАСНА ЗАРАЗНА БОЛЕСТ ДОМАЋИХ И ДИВЉИХ СВИЊА!

### БОЛЕСТ СЕ ШИРИ:

КОНТАКТОМ ЗАРАЖЕНИХ СА ЗДРАВИМ СВИЊАМА;  
ИСХРАНОМ СВИЊА ПОМИЈАМА У КОЈИМА ИМА  
КОНТАМИНИРАНИХ ОСТАТАКА ХРАНЕ;  
КОНТАМИНИРАНОМ ХРАНОМ, ВОДОМ;  
ИНФИЦИРАНИМ КРПЕЉИМА; ОДЕЋОМ И ОБУЋОМ;  
КОНТАМИНИРАНИМ ПРЕДМЕТИМА И ОПРЕМОМ;  
ПРЕВОЗНИМ СРЕДСТВИМА;  
СТАЈЊАКОМ; ЛЕШЕВИМА УГИНУЛИХ И ЗАКЛАНИХ  
ЖИВОТИЊА; ГЛОДАРИМА; ИНСЕКТИМА.

### ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ:

- НЕ ХРАНИТИ СВИЊЕ ПОМИЈАМА;- ИЗБЕГАВАТИ ПАШНО  
ДРЖАЊЕ СВИЊА;- СПРЕЧИТИ ДИРЕКТАН КОНТАКТ  
ДИВЉИХ СА ДОМАЋИМ СВИЊАМА ; - ОСОБЕ КОЈЕ СУ  
БИЛЕ У КОНТАКТУ СА ДИВЉИМ СВИЊАМА МОРАЈУ ДОБРО  
ОПРАТИ И ДЕЗИНФИКОВАТИ ОДЕЋУ И ОБУЋУ;- ОБАВЕЗНА  
ПРИЈАВА СВАКЕ БОЛЕСНЕ ИЛИ УГИНУЛЕ ДОМАЋЕ ИЛИ  
ДИВЉЕ СВИЊЕ НАДЛЕЖНОМ ВЕТЕРИНАРУ;- ПОСТАВИТИ  
ДЕЗБАРИЈЕРЕ НА УЛАЗУ И ИЗЛАЗУ У ОБЈЕКАТ ГДЕ СЕ  
ДРЖЕ СВИЊЕ.

### КАКО ПРЕПОЗНАТИ АФРИЧКУ КУГУ СВИЊА:

ИЗНЕНАДНО УГИНУЋЕ ЈЕДНЕ И ВИШЕ СВИЊА ; ГУБИТАК  
АПЕТИТА; ПОТИШТЕНОСТ; ПОВИШЕНА ТЕЛЕСНА  
ТЕМПЕРАТУРА ДО 42°C ; КРВАРЕЊА ПО КОЖИ (најчешће  
по ушима, њушци, репу, ногама, стомаку и бочним  
странама трупа); КРВАВ ПРОЛИВ; ПОБАЧАЈИ;  
НЕСИГУРНОСТ У ХОДУ; ОТЕЖАНО ДИСАЊЕ; КАШЉАЊЕ,  
ПОВРАЋАЊЕ;

### ПОСЕБНО ВАЖНО:

- **ОБОЉЕВАЈУ СВИЊЕ СВИХ КАТЕГОРИЈА**
- **УГИНУ СВЕ ОБОЛЕЛЕ ЖИВОТИЊЕ**
- **ВИРУС АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА НЕ ПРЕДСТАВЉА ОПАСНОСТ ЗА ЉУДЕ И ДРУГЕ ВРСТЕ ЖИВОТИЊА**
- **НЕМА ЛЕЧЕЊА КУГЕ СВИЊА**
- **ВАКЦИНА НЕ ПОСТОЈИ НИГДЕ У СВЕТУ**
- **У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ АКС СПРОВОДИ СЕ УБИЈАЊЕ СВИЊА НА ГАЗДИНСТВУ.**



МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА  
И ВОДОПРИВРЕДЕ  
УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ


# АФРИЧКА КУГА СВИЊА

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ЛОВИШТА  
И ЛОВАЦА  
У РАНОМ ОТКРИВАЊУ И  
СПРЕЧАВАЊУ ПОЈАВЉИВАЊА  
АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА



УПУТСТВО ЗА ЛОВЦЕ

## Начин пријаве болести



- Свако обољевање, или угинуће дивљих свиња обавезно треба пријавити надлежном ловном и ветеринарском инспектору територијално надлежном за ловно подручје ( са циљем узимања узорака ради лабораторијско испитивање на АКС и ККС);
- Од дивљих свиња страдалих од удара аутомобила на путевима такође је обавезно узорковање (комад слезине и крајника-тонзила) ради лабораторијског испитивања на АКС и ККС,
- У ловишту немојте остављати за собом отпатке хране која садржи остаци хране животињског порекла;
- У газдинствима са домаћим свињама забрањено је прихватање и држање дивљих свиња;

- Уколико у сопственом домаћинству/дворишту држите домаће свиње, обавезно, након сваког доласка из лова и ловишта промените одећу и обућу пре него приступите појењу, храћењу или чишћењу сопствених свиња;

- Усељавање дивљих свиња у ограђена ловишта (нпр. гатера, узгајивалишта), или измештање дивљих свиња у слободну природу (тзв. "отворена ловишта"), претходно обавезно пријавити и надлежном ветеринарском инспектору.

- У зоолошким вртovima, обавезна је пријава сваког уоченог обољевања или угинућа надлежном ветеринарском инспектору;

- Замолите ловце који долазе из земаља заражених АКС да не доносе са собом намирнице припремљене од свињског меса пореклом од домаћих и дивљих свиња. АКС се врло често преноси контаминираном храном;



- Радници који раде на фармама свиња или већим газдинствима свиња, а баве се ловом пре започињања рада обавезно да пријаве руководиоцу фарме да су учествовали у таквом лову у којем су уочена неприродно понашање или сумња на болест код дивљих свиња,

- Проценити на ловишту број чопора дивљих свиња, бројно стање и густину популације дивљих свиња у њима и пратити њихово кретање и сваку промену јер „нестанак“ – изумирање појединих стада дивљих свиња може бити први знак АКС;

- Спроводите стални надзор на хранилиштима, појилиштима. Њихова систематска контрола може дати важне податке о кретању заразе;

- Обавезно је спровођење прописаног мониторинга болести АКС и ККС код дивљих свиња и сходно томе обавезно је слање прописаног броја узорака из сваког ловишта у надлежни Ветеринарски институт током године;

-Код одстрела дивљих свиња узети крв из срца (или ако то није могуће онда из већег крвног суда одстрелене дивље свиње), и неизоставно комад крајника (тонзила) и слезине. По испуњавању Упута за анализу узорке треба предати у надлежни Ветеринарски институт из којих ће се извршити анализа и на присуство узрочника АКС.

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА  
И ВОДОПРИВРЕДЕ  
УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ